農業試驗所特刊第159號
Special Publication of TARI No. 159

桃 Peach

桃品種圖鑑
Peach variety illustrations

序言

民國60年代以前台灣低海拔地區桃主要栽種品種是鶯歌桃，分類上屬於硬肉桃品種，橫貫公路開通後，自日本引進水蜜桃品種如松森早生、倉方早生、白鳳、中津白桃、西野白桃等在梨山一帶種植，甜蜜多汁的果實深受國人喜愛，隨著桃新品種如八幡白鳳、川中島白桃等品種的育成與引進，這些品種漸漸的被新的品種取代，有的已不復得見，有的僅剩少量栽種。民國70年經由前輔導會福壽山農場宋慶雲場長接洽，由日本果樹試驗場吉田雅夫博士處引進桃品種100 餘種，在農試所霧峰本所試種觀察，數年後高需冷性品種移轉至台大梅峰農場種植，低需冷性品種如Premier,Tutu,Talism 等則進行區域試種及作爲桃品種改良的育種親本，其中 Premier因爲果實品質好、冬季休眠所需低溫時數少，是台灣低海拔地區第一個可栽培的水蜜桃品種，故正式命名爲台農甜蜜，栽培面積曾達1200公頃左右。隨著低需冷性桃育種計畫的開始，許多低需冷性桃品種自佛羅里達、南非、巴西等地陸續引進觀察，利用這些品種做爲親本，育成了適合台灣消費者口味的低需冷性桃品種，現在桃子產期由低海拔的3月至高海拔的8月，長達半年，消費者都可以享受到桃子甜蜜的滋味。本書記錄農試所歷年來調查這些桃品種的特性，配合彩色圖片，讓讀者可以了解30年來台灣桃品種的更替，果樹研究人員也可以明瞭桃種原特性，作爲品種改良之參考。本書出版承蒙國科會數位典藏計畫(NSC99-2631-H-055-002)經費資助，特此致謝。時值建國百年，謹以百桃爲中華民國祝壽。

農業試驗所所長 陳駿季

中華民國100年11月

桃 Peach

桃品種圖鑑

Peach variety illustrations

目錄

品種名：5-16W 01
品種名：Armking 02
品種名：De Wet 03
品種名：Favortop 04
品種名：Fantasia 05
品種名：Flordabelle 06
品種名：Flordagold 07
品種名：Flordaking 08
品種名：Flordaprince 09
品種名：Flordared 10
品種名：New Yorker 11
品種名：P101 12
品種名：Rit-6 13
品種名：Red Haven 14
品種名：Safari 15
品種名：Spring Crest 16
品種名：Spring Lady 17
品種名：Spring Rose 18
品種名：Sunraycer 19
品種名：Sunhome 20
品種名：Sunwright 21
品種名：Sweetgold 22
品種名：Talisma 23
品種名：TropicBeauty 24
品種名：TropicSnow 25
品種名：Tutu 26
品種名：UFGold 27
品種名：UFO 28
品種名：UFQueen 29
品種名：福州大桃 30
品種名：福壽桃 31
品種名：鶯歌桃 32
品種名：早紅桃 33

品種名：台農甜蜜 34
品種名：春蜜 35
品種名：紅玉 36
品種名：江西九號 27
品種名：江西924 28
品種名：江西雪雨露 29
品種名：紅月 40
品種名：紅清水 41
品種名：千曲 42
品種名：興津 43
品種名：曉 44
品種名：曉星 45
品種名：純白 46
品種名：血桃 47
品種名：上海水蜜 48
品種名：離核水蜜 49
品種名：錦A 50
品種名：錦B 51
品種名：土用 52
品種名：夕空 53
品種名：大久保 54
品種名：長野早生 55
品種名：倉方早生 56
品種名：大和早生 57
品種名：小平早生 58
品種名：布目早生 59
品種名：松森早生 60
品種名：砂子早生 61
品種名：櫛形白桃 62
品種名：德安白桃 63
品種名：入江白桃 64
品種名：大和白桃 65
品種名：淺間白桃 66
品種名：勘助白桃 67
品種名：愛知白桃 68
品種名：山根白桃 69
品種名：鈴木白桃 70
品種名：西野白桃 71
品種名：志賀白桃 72
品種名：岡山白桃 73
品種名：中津白桃 74
品種名：阿部白桃 75
品種名：山梨白桃 76
品種名：清水白桃 77
品種名：川中島白桃 78
品種名：瀨戶內白桃 79
品種名：秋白桃 80
品種名：泉白桃 81
品種名：紅鳳 82
品種名：白鳳 83
品種名：武井早生白鳳 84
品種名：八幡白鳳 85
品種名：長澤白鳳 86
品種名：大玉白鳳 87
品種名：御坂白鳳 88
品種名：都白鳳 89
品種名：新白鳳 90
品種名：八重咲蟠桃 91
品種名：早生油桃 92
品種名：黃金桃 93
品種名：油桃4號 94
品種名：油桃5號 95
品種名：油桃6號 96
品種名：油桃8號 97
品種名：油桃9號 98
品種名：油桃14號 99
品種名：罐桃11號 100

桃 Peach

品種名：5-16W
來源：佛羅里達
樹姿：開張
樹勢：中庸
開花期：3月中旬
成熟期：7月上旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：綠色，向陽面紅褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：漸尖
葉基部形狀：廣楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形
花色：粉紅色
果型：圓形

縫 合 線：中深
果頂形狀：圓凸
對 稱 性：對稱
果皮顏色：紅
表皮絨毛：細,多
皮剝離難易：皮不易剝離
果肉顏色：白色
果肉質地：細
果肉與核之粘離：離核
平均果重 (g)：175
可溶性固形物 (°Brix) ：10.7
可滴定酸(%)：0.29
產量：豐產
核 顏 色：紅色
核 形 狀：倒卵圓形
用 途：鮮食

品種名：Armking
來源：美國品種,親本為'Palomar' 與 'Springtime'雜交選出
樹姿：較直立
樹勢：強
開花期：3月下旬
成熟期：6月下旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：褐色
葉緣形狀：細鋸齒狀
葉尖形狀：漸尖
葉基部形狀：楔形
腺體：圓形
花型：鈴形
花色：粉紅色
果型：橢圓形
縫合線：淺
果頂形狀：圓凸
對稱性：較對稱
果皮顏色：黃色、全面著鮮紅色暈
表皮絨毛：無
皮剝離難易：皮易剝離
果肉顏色：橙黃色、近核處無紅色
果肉質地：細、纖維和汁液中等、為硬溶質
果肉與核之粘離：黏核
平均果重 (g)：126
可溶性固形物 (˚Brix)：10.9
可滴定酸(%)：0.56
產量：豐產
核顏色：木黃色
核形狀：橢圓形
用途：鮮食

桃 Peach



De Wet

品種名：De Wet
來源：南非
樹姿：張開
樹勢：強健
開花期：2月上旬
成熟期：4月中旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：褐色
葉緣形狀：細鋸齒狀
葉尖形狀：漸尖
葉基部形狀：寬楔形
腺體：腎形
花型：鈴形
花色：粉紅色
果型：近圓形
縫合線：深
果頂形狀：圓凸
對稱性：稍不對稱
果皮顏色：紅色
表皮絨毛：有
皮剝離難易：皮易剝離
果肉顏色：黃色
果肉質地：肉質細，溶質
果肉與核之粘離：離核
平均果重 (g)：126
可溶性固形物 (˚Brix)：12
可滴定酸(%)：0.31
產量：豐產
核顏色：木黃色
核形狀：倒卵圓形
用途：鮮食

Favortop

品種名：Favortop
來源：美國農業部加利福尼亞園藝試驗站1961年從 'Fairtime' 實生苗中選出的中熟油桃品種
樹姿：半開張
樹勢：強
開花期：3月中旬
成熟期：7月上旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：綠色,向陽面紅褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：急尖
葉基部形狀：楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形
花色：粉紅色
果型：圓形
縫合線：淺
果頂形狀：圓平
對稱性：對稱
果皮顏色：黃色,全面著紅色暈
表皮絨毛：無
皮剝離難易：皮易剝離
果肉顏色：橙黃色,近核處少有紅色
果肉質地：較粗,纖維和汁液中等,為硬溶質
果肉與核之粘離：離核
平均果重 (g)：142
可溶性固形物 (°Brix)：10.8
可滴定酸(%)：0.62
產量：較低
核顏色：木黃色
核形狀：倒卵圓形
用途：鮮食

Fantasia

品種名：Fantasia
來源：美國農業部加利福尼亞園藝試驗站以'Gold King'與'Red King'雜交培育而成的中熟油桃品種
樹姿：半開張
樹勢：強
開花期：4月上旬
成熟期：8月上旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：綠色,向陽面褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：漸尖
葉基部形狀：楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形
花色：粉紅色
果型：圓形
縫合線：淺
果頂形狀：圓平
對稱性：對稱
果皮顏色：黃色,全面著紫紅色暈
表皮絨毛：無
皮剝離難易：皮易剝離
果肉顏色：橙黃色,近核處少有紅色
果肉質地：較粗,纖維和汁液中等,為硬溶質
果肉與核之粘離：離核
平均果重 (g)：216
可溶性固形物 (°Brix)：12
可滴定酸(%)：0.56
產量：偏低
核顏色：紅色
核形狀：倒卵圓形
用途：鮮食

Flordabelle

品種名：Flordabelle
來源：佛羅里達
樹姿：開張
樹勢：強
開花期：1月下旬
成熟期：5月上旬
葉型：披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：綠色,向陽面紅褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：漸尖
葉基部形狀：楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形
花色：粉紅色
果型：圓形

縫合線：不明顯
果頂形狀：圓平
對稱性：對稱
果皮顏色：底色淺黃色,著紅暈
表皮絨毛：多
皮剝離難易：皮易剝離
果肉顏色：黃色帶紅
果肉質地：軟溶質
果肉與核之粘離：離核
平均果重 (g)：145
可溶性固形物 (˚Brix)：12
可滴定酸(%)：0.62
產量：高
核顏色：玫瑰色
核形狀：寬卵型
用途：鮮食

桃 Peach

Flordagold

品種名：Flordagold
來源：佛羅里達
樹姿：半開張
樹勢：強
開花期：1月下旬
成熟期：5月上旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：漸尖
葉基部形狀：楔形
腺體：腎形
花型：薔薇型,單瓣
花色：粉紅色
果型：橢圓

縫合線：明顯
果頂形狀：圓,微凸
對稱性：稍對稱
果皮顏色：紅色
表皮絨毛：有
皮剝離難易：可
果肉顏色：黃色帶紅色
果肉質地：軟溶質
果肉與核之粘離：離核
平均果重 (g)：85
可溶性固形物 (°Brix)：12
可滴定酸(%)：0.58
產量：豐產
核顏色：紅色
核形狀：寬卵形
用途：鮮食

Flordaking

品種名：Flordaking
來源：佛羅里達
樹姿：半開張
樹勢：中等
開花期：2月上旬
成熟期：5月中旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：綠色,向陽面帶紅褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：漸尖
葉基部形狀：楔形
腺體：圓形
花型：鈴形,單瓣
花色：粉紅色
果型：近圓形
縫合線：淺
果頂形狀：圓,微凸
對稱性：對稱
果皮顏色：紅色
表皮絨毛：有
皮剝離難易：熟果可剝皮
果肉顏色：黃色
果肉質地：軟溶質
果肉與核之粘離：離核
平均果重 (g)：140
可溶性固形物 (°Brix)：11
可滴定酸(%)：0.4
產量：豐產
核顏色：木黃色
核形狀：寬卵形
用途：鮮食

桃 Peach

Flordaprince

品種名：Flordaprince
來源：佛羅里達
樹姿：開張
樹勢：弱
開花期：1月下旬
成熟期：4月下旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：紅褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：漸尖
葉基部形狀：楔形
腺體：腎形
花型：薔薇型,單瓣
花色：粉紅色
果型：近圓形
縫合線：淺
果頂形狀：圓,微凸
對稱性：對稱
果皮顏色：紅色
表皮絨毛：有
皮剝離難易：熟果可剝皮
果肉顏色：黃色
果肉質地：軟溶質
果肉與核之粘離：黏核
平均果重 (g)：125
可溶性固形物 (˚Brix)：11.4
可滴定酸(%)：0.55
產量：豐產
核顏色：木黃色帶玫瑰紅
核形狀：寬卵形
用途：鮮食

Flordared

品種名：Flordared
來源：佛羅里
樹姿：半開張
樹勢：強　　達
開花期：1月下旬
成熟期：5月中旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：紅褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：漸尖
葉基部形狀：楔形
腺體：腎形
花型：薔薇型,單瓣
花色：粉紅色
果型：圓形
縫合線：中等
果頂形狀：圓,微凸
對稱性：稍對稱
果皮顏色：黃色略帶紅色
表皮絨毛：有
皮剝離難易：可剝皮
果肉顏色：白色帶紅色
果肉質地：軟溶質
果肉與核之粘離：離核
平均果重 (g)：121.8
可溶性固形物 (˚Brix)：12
可滴定酸(%)：0.75
產量：豐產
核顏色：木黃色
核形狀：橢圓形
用途：鮮食

桃 Peach

New Yorker

品種名：New Yorker
來源：美國(Livingston XGreensboro)OP_2
樹姿：半開張
樹勢：強
開花期：3月中旬
成熟期：7月上旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：褐色
葉緣形狀：細鋸齒狀
葉尖形狀：漸尖
葉基部形狀：楔形
腺體：腎形
花型：鈴形
花色：粉紅色
果型：圓形
縫合線：淺
果頂形狀：圓平
對稱性：對稱
果皮顏色：紅色
表皮絨毛：無
皮剝離難易：皮易剝離
果肉顏色：全白肉
果肉質地：細,纖維和汁液中等,為硬溶質
果肉與核之粘離：離核
平均果重 (g)：100
可溶性固形物 (˚Brix)：11.6
可滴定酸(%)：0.71
產量：中等
核顏色：木黃色
核形狀：倒卵圓形
用途：鮮食

P101

品種名：P101
來源：美國，又名熱帶白鳳
樹姿：半開張
樹勢：強
開花期：2月上旬
成熟期：6月上旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：褐色
葉緣形狀：細鋸齒狀
葉尖形狀：急尖
葉基部形狀：楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形
花色：粉紅色
果型：圓形

縫合線：淺
果頂形狀：圓形,微凹
對稱性：對稱
果皮顏色：淡紅色
表皮絨毛：短,細
皮剝離難易：皮易剝離
果肉顏色：白色
果肉質地：細,多汁
果肉與核之粘離：離核
平均果重 (g)：180
可溶性固形物 (˚Brix)：11.5
可滴定酸(%)：0.63
產量：中等
核顏色：木黃色
核形狀：橢圓形
用途：鮮食或加工



Rit-6

品種名：Rit-6
來源：美國
樹姿：開張
樹勢：強
開花期：3月中旬
成熟期：6月下旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：深綠色
一年生枝條顏色：綠色,向陽面呈紅色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：急尖
葉基部形狀：廣楔形
腺體：腎形或圓形
花型：薔薇形
花色：粉紅色
果型：扁平
縫合線：中深
果頂形狀：凹入
對稱性：對稱
果皮顏色：底色黃綠,頂部著紅暈及紅斑
表皮絨毛：細長而多
皮剝離難易：不易剝離
果肉顏色：黃色
果肉質地：細,纖維中粗
果肉與核之粘離：離核
平均果重 (g)：145
可溶性固形物 (˚Brix)：11.3
可滴定酸(%)：0.55
產量：豐產
核顏色：紅褐色
核形狀：扁圓形
用途：鮮食

Red Haven

品種名：Red Haven
來源：美國密西根州試驗站以Ralehaven
　　　與Kalhaven為親本雜交選育成的中
　　　熟鮮食黃桃品種
樹姿：半開張
樹勢：強
開花期：3月中旬
成熟期：7月上旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：紅褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：漸尖
葉基部形狀：楔形
腺體：圓形
花型：鈴形
花色：粉紅色
果型：近圓形
縫合線：中深
果頂形狀：圓凸
對稱性：不對稱
果皮顏色：底色淺黃,全果著紅色
表皮絨毛：多
皮剝離難易：皮不易剝離
果肉顏色：金黃色,近核處帶少量紅色素
果肉質地：軟溶質,纖維稍粗,汁液多
果肉與核之粘離：離核
平均果重 (g)：213
可溶性固形物 (˚Brix)：9.1
可滴定酸(%)：0.42
產量：豐產
核顏色：木黃色
核形狀：倒卵圓形
用途：鮮食,加工

品種名：Safari
來源：南非
樹姿：開張
樹勢：強
開花期：3月初
成熟期：7月上旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：綠色,**向陽面紅褐色**
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：急尖
葉基部形狀：寬楔形
腺體：腎形
花型：鈴形
花色：粉紅色
果型：近圓形

縫合線：中深
果頂形狀：圓,微凹
對稱性：不對稱
果皮顏色：橘黃色
表皮絨毛：中等
皮剝離難易：皮不易剝離
果肉顏色：淺黃色
果肉質地：細
果肉與核之粘離：離核
平均果重 (g)：247
可溶性固形物 (°Brix)：9.7
可滴定酸(%)：0.58
產量：中等
核顏色：紅色
核形狀：倒卵圓形
用途：鮮食



Spring Crest

品種名：Spring Crest
來源：美國喬治亞州
樹姿：開張
樹勢：中等
開花期：3月中旬
成熟期：7月上旬
葉型：披針形
葉色：深綠色
一年生枝條顏色：褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：漸尖
葉基部形狀：寬楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形
花色：粉紅色
果型：卵圓形

縫合線：淺
果頂形狀：圓凸
對稱性：稍不對稱
果皮顏色：紅色
表皮絨毛：長
皮剝離難易：不易剝離
果肉顏色：黃色
果肉質地：鬆軟多汁,纖維中粗
果肉與核之粘離：離核
平均果重 (g)：76.5
可溶性固形物 (˚Brix)：9.7
可滴定酸(%)：0.64
產量：豐產
核顏色：木黃色
核形狀：橢圓形
用途：鮮食

Spring Lady

品種名：Spring Lady
來源：美國喬治亞州
樹姿：半開張
樹勢：強
開花期：3月中旬
成熟期：6月下旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：綠色,向陽面紅褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：急尖
葉基部形狀：寬楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形
花色：粉紅色
果型：卵圓形
縫合線：淺
果頂形狀：圓凸
對稱性：稍不對稱
果皮顏色：紅色
表皮絨毛：細,短
皮剝離難易：皮易剝離
果肉顏色：淡黃色
果肉質地：細,多汁,溶質
果肉與核之粘離：黏核
平均果重 (g)：155
可溶性固形物 (°Brix)：10.5
可滴定酸(%)：0.82
產量：豐產
核顏色：木黃色
核形狀：橢圓形
用途：鮮食

品種名：Spring Rose
來源：美國
樹姿：開張
樹勢：中等
開花期：3月中旬
成熟期：7月上旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：褐色
葉緣形狀：細鋸齒狀
葉尖形狀：漸尖
葉基部形狀：寬楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形
花色：粉紅色
果型：尖圓形

縫合線：淺
果頂形狀：尖凸
對稱性：不對稱
果皮顏色：紅
表皮絨毛：中長,多
皮剝離難易：熟果易剝皮
果肉顏色：白肉,部分帶淺粉紅色
果肉質地：鬆軟多汁,纖維長
果肉與核之粘離：黏核
平均果重 (g)：85.3
可溶性固形物 (°Brix)：11
可滴定酸(%)：0.84
產量：豐產
核顏色：木黃色
核形狀：倒卵圓形
用途：鮮食

桃 Peach

Sunraycer

品種名：Sunraycer
來源：佛羅里達
樹姿：半開張
樹勢：強
開花期：1月下旬
成熟期：5月上旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：紅褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：漸尖

葉基部形狀：楔形
腺體：腎形
花型：鈴形,單瓣
花色：粉紅色
果型：長圓形
縫合線：淺
果頂形狀：圓,微凹
對稱性：對稱
果皮顏色：紅色
表皮絨毛：無
皮剝離難易：難剝皮

果肉顏色：黃色
果肉質地：軟溶質
果肉與核之粘離：離核
平均果重 (g)：155
可溶性固形物 (˚Brix)：12.6
可滴定酸(%)：0.90
產量：豐產
核顏色：木黃色
核形狀：長卵形
用途：鮮食



Sunhome

品種名：Sunhome
來源：佛羅里達
樹姿：半開張
樹勢：強
開花期：1月下旬
成熟期：5月中旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：新葉紅色，成熟葉綠色
一年生枝條顏色：褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：漸尖
葉基部形狀：楔形
腺體：腎形
花型：薔薇型,單瓣
花色：粉紅色
果型：圓形

縫合線：淺
果頂形狀：圓平
對稱性：對稱
果皮顏色：紅色
表皮絨毛：無
皮剝離難易：難剝皮
果肉顏色：黃色
果肉質地：軟溶質
果肉與核之粘離：離核
平均果重 (g)：80
可溶性固形物 (°Brix)：9.6
可滴定酸(%)：0.85
產量：中等
核顏色：玫瑰紅
核形狀：卵形
用途：鮮食

桃 Peach

Sunwright

品種名：Sunwright
來源：佛羅里達
樹姿：半開張
樹勢：強
開花期：1月下旬
成熟期：5月上旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：漸尖
葉基部形狀：楔形
腺體：腎形
花型：薔薇型,單瓣
花色：粉紅色
果型：圓形

縫合線：淺
果頂形狀：圓,微凹
對稱性：對稱
果皮顏色：深紅色,熟果呈暗紅色
表皮絨毛：無
皮剝離難易：難剝皮
果肉顏色：黃色
果肉質地：軟溶質
果肉與核之粘離：離核
平均果重 (g)：145.5
可溶性固形物 (˚Brix)：11.8
可滴定酸(%)：1.10
產量：豐產
核顏色：木黃色
核形狀：橢圓形
用途：鮮食

品種名：Sweetgold
來源：日本
樹姿：稍直立
樹勢：中庸
開花期：3月中旬
成熟期：6月下旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：綠色,向陽面紅褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：急尖
葉基部形狀：楔形
腺體：腎形
花型：鈴形
花色：粉紅色
果型：近圓形
縫合線：淺
果頂形狀：尖圓
對稱性：對稱
果皮顏色：底色黃,著紅暈
表皮絨毛：長毛
皮剝離難易：皮易剝離
果肉顏色：黃色
果肉質地：纖維中粗,溶質
果肉與核之粘離：黏核
平均果重 (g)：151.4
可溶性固形物 (˚Brix)：9.3
可滴定酸(%)：0.59
產量：豐產
核顏色：褐色
核形狀：倒卵圓形
用途：鮮食